



ВАЖНО!!! ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ

Пневмококковая инфекция вызывается болезнетворными микробами, обитающими в слизистых оболочках человека, которые проникают в организм и могут вызывать:

- тяжелое воспаление легких;
- заражение крови;
- воспаление головного мозга, приводящее к умственной отсталости;
- тяжелое воспаление уха, приводящее к глухоте, и околоносовых пазух;
- гнойное расплавление костей и поражение суставов.

Эти заболевания могут значительно ухудшать здоровье ребенка, приводить к инвалидности, а иногда и к смертельным исходам!!!

Вакцина Превенар 13 представляет собой набор 13-ти неживых видов пневмококка. Начинается вакцинация против пневмококковой инфекции по национальному календарю с 2-х месячного возраста, проводится в несколько этапов.

В возрасте 5-17 лет однократное введение вакцины Превенар 13, ранее не вакцинированным детям, способно обеспечить необходимый иммунный ответ на все виды возбудителя, входящие в состав вакцины.

Вакцинация защищает ребенка от болезнетворных видов пневмококка и уменьшает образование антибиотикоустойчивых форм бактерий.

Пневмококковые вакцины хорошо переносятся и не вызывают серьезных побочных эффектов.

После введения вакцины может быть местное покраснение или уплотнение. Редко отмечается повышение температуры тела, недомогание, плаксивость, снижение аппетита.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- острое заболевание (вакцинация возможна через 1 месяц);
- обострение хронического заболевания (вакцинация возможна вне обострения);
- аллергическая реакция на предшествующее введение вакцины против пневмококка или против дифтерии.

Факторы риска развития тяжелых пневмококковых инфекций:

Для детей от 0 до 3-х лет:

- низкая масса тела при рождении;
- недоношенность;
- посещение детского коллектива;
- пассивное курение;
- раннее искусственное вскармливание.

Для детей старше 3-х лет:

- переохлаждение;
- стрессовые ситуации в детском саду и школе;
- вирусные инфекции (грипп);
- хронические заболевания (бронхиальная астма).